

Médicaments non psychostimulants autorisés pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité

Principe actif (nom commercial)	Écart des doses quotidiennes en milligramme	Demi-vie en heures	Prescrit à
Guanfacine à libération prolongée <i>(Intuniv XR)</i>	Enfants : 1 mg à 4 mg par jour Tenir compte du poids de la personne.	18 h	L'innocuité et l'efficacité d' <i>Intuniv XR</i> n'ont pas été établies chez l'enfant pesant moins de 25kg (55lb). Il est déconseillé de prescrire <i>Intuniv XR</i> à un enfant s'il est âgé de moins de 6 ans ou de plus de 12 ans. L'efficacité d' <i>Intuniv XR</i> n'a pas été établie chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans. <i>Intuniv XR</i> n'a pas fait l'objet d'études systématiques chez l'adulte de 18 ans et plus; il n'est donc pas indiqué dans cette population. Enfants (âgés de 6 à 12 ans)
Atomoxetine <i>(Strattera)</i>	Enfants de plus de 6 ans et adolescents pesant jusqu'à 70 kg : De 0,5 mg/kg à 1,4 mg/kg ou 60 mg par jour, en fonction de chaque étape du processus d'ajustement de la dose.	5 h	L'innocuité et l'efficacité du <i>Strattera</i> n'ont pas été établies pour les enfants de moins de 6 ans. Enfants (âgés de 6 à 12 ans) Adolescents (âgés de 13 à 17 ans) Adultes (âgés de plus de 18 ans)

Source : AGIDD-SMQ, formation L'autre côté de la pilule, 2019