

Antipsychotiques ou neuroleptiques de première génération

| Principe actif (nom commercial) | Écart des doses quotidiennes en milligramme en période de crise | Écart des doses quotidiennes en milligramme en période d'entretien | Demi-vie en heures |
|---|--|--|--------------------|
| Chlorpromazine (<i>Largactil</i>) | 200 à 2000 | 50 à 2000 | 30 |
| Fluphénazine (<i>Moditen</i>) | 10 à 80 | 2 à 20 | 15 |
| Flupenthixol (<i>Fluanxol</i>) | 6 à 30 | 3 à 12 | 24 |
| Haloperidol (<i>Haldol</i>) | 10 à 40 | 2 à 40 | 21 |
| Loxapine (<i>Loxapac</i>) | 40 à 300 | 15 à 200 | 8 |
| Mésoridazine (<i>Serentil</i>) | 100 à 400 | 25 à 200 | 44 à 48 |
| Méthotriméprazine (<i>Nozinan</i>) | 25 à 200 | 25 à 50 | 15 à 80 |
| Perphénazine (<i>Trilafon</i>) | 8 à 96 | 4 à 32 | 8 à 20 |
| Thiothixène (<i>Navane</i>) | 10 à 80 | 2 à 30 | 10 à 20 |
| Thiopropérazine (<i>Majeptil</i>) | – | 2 à 40 | 12 à 30 |
| Thioridazine (<i>Mellaril</i>) | 200 à 800 | 50 à 400 | 7 à 20 |
| Trifluopérazine (<i>Stelazine</i>) | 10 à 80 | 2 à 30 | 10 à 20 |
| Pimozide (<i>Orap</i>) | 8 à 40 | 1 à 20 | 55 à 150 |

Source : AGIDD-SMQ, formation L'autre côté de la pilule, 2019