

Les psychostimulants
Psychostimulants à base d'amphétamine

Principe actif (nom commercial)	Écart des doses quotidiennes en milligramme	Demi-vie en heures	Prescrit à
Sels mixtes d'amphétamine à libération prolongée (Adderall XR)	5 mg à 30 mg par jour	Enfants : 7 h à 11 h Adolescents âgés de 13 à 17 ans et pesant de 75 kg à 165 lb : 11 h à 14 h Adultes : 10 h à 12 h	Les amphétamines ne sont pas recommandées chez les enfants de moins de 6 ans. Enfants (âgés de 6 à 12 ans) Adolescents (âgés de 13 à 17 ans) Adultes (âgés de plus de 18 ans)
Dimésylate de lisdexamfétamine (Vyvanse)	20 mg à 60 mg par jour Vyvanse n'a pas fait l'objet d'études à des doses supérieures à 70mg/jour	12 h à 14 h	Vyvanse ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 ans. Enfants (âgés de 6 à 12 ans) Adolescents (âgés de 13 à 17 ans) Adultes (âgés de plus de 18 ans). Première option L'efficacité de Vyvanse n'a pas été étudiée chez les adultes de plus de 55 ans.
Sulfate de dexamphétamine (Dexedrine)	2,5 mg à 40 mg	4 h à 6 h	Les amphétamines ne sont pas recommandées chez les enfants de moins de 6 ans. Enfants (âgés de 6 à 12 ans) Adolescents (âgés de 13 à 17 ans) Adultes (âgés de plus de 18 ans)

Source : AGIDD-SMQ, formation L'autre côté de la pilule, 2019

